



**Previcox™**  
(firocoxib)  
Comprimidos Mastigáveis

9 2 1 6 1 8

**USO VETERINÁRIO**

**FÓRMULA:** Cada comprimido de PREVICOX™ contém

| Nome dos<br>Ingredientes | % m/m | Quantidade (mg/comprimido) |                         |
|--------------------------|-------|----------------------------|-------------------------|
|                          |       | Comprimido<br>de 57 mg     | Comprimido<br>de 227 mg |
| Firocoxib                | 24,0  | 57                         | 227                     |
| Excipiente q.s.p.        | 76,0  | 180                        | 720                     |

**INDICAÇÕES**

Antiinflamatório não esteróide (AINE) para alívio da dor e inflamação associadas à osteoartrite e manejo da dor e inflamação perioperatória associada à cirurgia de tecidos moles dos cães.

5 mg por kg de peso corporal, uma vez ao dia.

**VIAS E MODO DE ADMINISTRAÇÃO**

Administrar por via oral de acordo com a seguinte tabela:

| Peso corporal<br>(kg) | Número de Comprimidos por administração |        |
|-----------------------|---|--------|
|                       | 57 mg                                   | 227 mg |
| Até 3 kg              | ¼                                       |        |
| 3 – 5,5               | ½                                       |        |
| 5,6 – 10              | 1                                       |        |
| 10,1 – 15             | 1 ½                                     |        |
| 15,1 – 22             |   | ½      |
| 22,1 – 45             |   | 1      |
| 45,1 – 68             |   | 1 ½    |
| 68,1 – 90             |   | 2      |

**AVISO SOBRE A CORRETA FORMA DE ADMINISTRAÇÃO**

Os comprimidos podem ser administrados sozinhos ou misturados com algum alimento.

A duração do tratamento varia segundo a resposta clínica.

Um tratamento de longa duração deve ser administrado sob controle veterinário constante.

**CONTRA-INDICAÇÕES**

Não usar em cadelas durante as fases de gestação e lactação.

**EFEITOS BIOLÓGICOS NÃO DESEJADOS**

Foram descritos casos raros de vômitos, geralmente transitórios e reversíveis com a interrupção do tratamento.

O médico veterinário deve ser informado sobre o aparecimento de efeitos adversos durante o tratamento.

**ARMAZENAMENTO**

Mantenha fora do alcance das crianças.

Conservar entre 15° e 30° C

**ADVERTÊNCIAS ESPECIAIS**

Não ultrapassar a dose recomendada em animais com menos de 12 semanas de idade.

Caso sejam observados efeitos adversos não desejados (diminuição do apetite ou emagrecimento), recomenda-se interromper o tratamento e comunicar ao Médico Veterinário.

PREVICOX™ não foi testado em cães com insuficiência hepática ou renal significativa. A utilização do produto nestes animais deve ser feita sob orientação do Médico Veterinário.

O tratamento prévio com substâncias antiinflamatórias pode provocar o aparecimento ou piora dos efeitos adversos. Recomenda-se, portanto, um período mínimo de 24 horas sem administração de outro medicamento antes de começar o tratamento com PREVICOX™. A duração deste período de transição deve ser adaptada em função das propriedades farmacocinéticas dos produtos utilizados anteriormente. PREVICOX™ não deve ser administrado simultaneamente com outros AINE ou glicocorticóides.

O uso de corticosteróides em pacientes tratados com antiinflamatórios não esteróides pode provocar um agravamento das ulcerações do trato gastrointestinal.

No caso de ingestão acidental por humanos, consulte imediatamente um médico e leve a bula.

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

PREVICOX™ Comprimidos Mastigáveis são comprimidos divisíveis, para garantir uma dose precisa e, com sabor defumado e caramelo, para torná-los mais atraentes para o cão facilitando assim sua administração.

**Modo de ação:**

Firocoxib é um antiinflamatório não esteróide (AINE) inibidor da ciclooxigenase (Coxib), com excelentes atividades antiinflamatória, analgésica e antipirética em animais. Administrado a uma dose terapêutica diária, o firocoxib não inibe a isoenzima COX-1, responsável pela manutenção das funções fisiológicas normais, mas bloqueia a biosíntese das prostaglandinas por meio da inibição da isoenzima indutora da ciclooxigenase (COX-2) responsável pela síntese dos mediadores inflamatórios. Nos exames de sangue total de cães, o firocoxib mostrou uma seletividade aproximadamente 380 vezes maior para COX-2 do que para a COX-1.

Para obter mais informações sobre este produto, ligue para 0800 888 7387

**VENDA SOB ORIENTAÇÃO DO MÉDICO VETERINÁRIO**

**Apresentação:** caixas com 10, 30 ou 180 comprimidos mastigáveis com 57 mg ou 227 mg, ou frascos de 60 comprimidos de 57 mg ou 227 mg.

**Validade do Produto:** 4 (quatro) anos após a data de fabricação.

Licenciado no Ministério da Agricultura sob Nº SP000023-0.000001 em 22/08/2016.

Resp. Técnica: Dra. Simone Zampieri CRMV-SP Nº 19.996

**Proprietário e fabricante:** Merial França

**Representante Exclusivo no Brasil, Importador e Distribuidor:** MERIAL Saúde Animal Ltda. Fazenda São Francisco – Paulínia. CNPJ: 57.600.249/0001-55

**PRÓDUTO IMPORTADO**

**Informações para proprietários de cães tratados com Previcox™**

Este sumário contém informações importantes sobre Previcox™, você deve lê-las atentamente antes de iniciar o tratamento de seu cão. Estas informações são complementares e não substituem as informações fornecidas pelo seu Médico Veterinário de confiança.

O que é Previcox™?

Previcox™ é um antiinflamatório não esteróide indicado para controle da dor e inflamação causada pela osteoartrite em cães. A osteoartrite é uma doença inflamatória dolorosa causada pelo "desgaste" das articulações. Os sintomas mais comuns associados a esta doença são:

- Claudicação (manqueira)
- Diminuição da atividade motora (relutância a se movimentar)
- Perda da mobilidade articular

Que tipo de resposta devo esperar de meu animal tratado com Previcox™?

Previcox™ é um medicamento auxiliar no tratamento da osteoartrite canina, proporcionando alívio dos sintomas e melhora clínica dos animais tratados.

- A melhora clínica varia de animal para animal, mas a diminuição dos sintomas pode ser excelente após a administração de Previcox™
- Na maioria dos cães a melhora clínica pode ser observada em poucos dias após o tratamento

Quais cães NÃO devem receber Previcox™?

- Animais sabidamente alérgicos ao composto químico ativo do produto (firocoxib)

- Animais que estejam recebendo outros antiinflamatórios (esteróides ou não)
- Cadelas gestantes ou que estejam amamentando seus filhotes

Previcox™ deve ser administrado apenas a cães

Este medicamento é específico para cães e não deve ser administrado a pessoas. Em caso de ingestão acidental do produto, procure seu Médico.

O que você deve dizer/perguntar ao seu Veterinário antes de administrar Previcox™ ao seu cão?

Converse com seu Veterinário sobre:

- Os sintomas de osteoartrite observados em seu cão (claudicação e dificuldade de locomoção)
- A importância do controle do peso no tratamento da osteoartrite canina
- Quais exames podem ser realizados antes que Previcox™ seja administrado ao seu animal
- Com que frequência seu cão deverá ser examinado enquanto estiver recebendo Previcox™
- Medicamentos que seu animal já esteja tomando ou que você pretenda administrar enquanto ele estiver recebendo Previcox™
- Se seu animal está gestante, amamentando ou se você planeja colocá-lo em reprodução durante o tratamento com Previcox™

Diga ao seu Veterinário se seu cão já apresentou os seguintes problemas:

- Qualquer sintoma adverso após a administração de Previcox™ ou outro antiinflamatório qualquer
- Distúrbios gastrointestinais (vômito ou diarreia) que seu animal tenha apresentado com frequência
- Doenças renais
- Doenças hepáticas
- Converse com ele sobre os medicamentos que já causaram algum tipo de reação adversa ou alérgica ao seu cão

Quais são os efeitos adversos que podem ocorrer durante a administração de Previcox™ ao seu cão?

- Devido ao seu mecanismo de ação (alta seletividade pela enzima COX-2) Previcox™ é um antiinflamatório extremamente seguro quando administrado na dose recomendada. No entanto, efeitos adversos podem ocorrer como na utilização de qualquer antiinflamatório, podendo-se observar: vômito, diarreia, fezes escurecidas, prostração e diminuição da ingestão dos alimentos. Caso algum destes sintomas seja observado, recomenda-se interromper o tratamento e consultar imediatamente o Médico Veterinário.

O que devo fazer caso meu cão ingira acidentalmente uma maior dose de Previcox™?

- Caso seu cão ingira mais comprimidos do que fora recomendado, avise seu Médico Veterinário.

