

Vetmedin®

Pimobendan



Composição:

Vetmedin® Comprimidos Mastigáveis para cães 1,25 mg
- Pimobendan 1,25 mg

Vetmedin® Comprimidos Mastigáveis para cães 5 mg
- Pimobendan 5 mg

Farmacodinâmica:

O Pimobendan, princípio ativo do **Vetmedin® Comprimidos Mastigáveis**, é um derivado de benzimidazol-piridazinona, um medicamento inotrópico positivo, não-simpatomimético, não-glicosídeo e com propriedades vasodilatadoras. O Pimobendan tem efeito estimulante no miocárdio pelo duplo mecanismo de ação, ou seja, além de aumentar a sensibilidade dos miofilamentos cardíacos ao cálcio, sem aumentar o consumo de oxigênio pelo miocárdio, também provoca a inibição da fosfodiesterase (tipo III) que resulta em vasodilatação arterial e venosa.

Indicações:

Vetmedin® Comprimidos Mastigáveis é indicado para o tratamento dos sinais leves, moderados ou severos de insuficiência cardíaca congestiva (ICC) em cães, originária de insuficiência valvar (regurgitação das válvulas mitral e/ou tricúspide) ou cardiomiopatia dilatada.

Vetmedin® Comprimidos Mastigáveis também é indicado para o tratamento de cardiomiopatia dilatada no estágio pré-clínico (assintomático com um aumento no diâmetro final do ventrículo esquerdo sistólico e diastólico) no Doberman Pinscher, após o diagnóstico ecocardiográfico de doença cardíaca.

A eficácia desse produto não foi avaliada pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.

Posologia, via de administração e modo de usar: administração exclusivamente pela via oral.

A dosagem é de 0,5 mg de Pimobendan/Kg de peso corporal, divididos em duas doses diárias.

Isto corresponde a:

Um comprimido mastigável de 1,25 mg pela manhã e um comprimido mastigável de 1,25 mg à noite para um peso corporal de 5 Kg (meio comprimido corresponde a metade da dose).

Um comprimido mastigável de 5 mg pela manhã e um comprimido mastigável de 5 mg à noite para um peso corporal de 20 Kg (meio comprimido corresponde a metade da dose).

Os comprimidos mastigáveis podem ser partidos pela metade na linha sulcada, para precisão de dosagem de acordo com o peso corporal.

Não exceder a dose recomendada.

Determinar precisamente o peso corporal antes do tratamento para assegurar a dosagem correta.

A dose deve ser mantida dentro do intervalo de dose de 0,2 mg a 0,6 mg de Pimobendan/Kg de peso corporal divididas em duas doses diárias, ou poderá ser ajustada individualmente de acordo com a severidade da enfermidade.

A dose de Vetmedin® Comprimidos Mastigáveis deve ser administrada cerca de uma hora antes da alimentação.

Vetmedin® Comprimidos Mastigáveis também pode ser usado em combinação com um diurético, por exemplo a furosemda.

No caso de insuficiência cardíaca congestiva, o tratamento contínuo ao longo da vida com **Vetmedin® Comprimidos Mastigáveis** pode ser recomendado, a critério do médico veterinário.

Interações medicamentosas:**Interação com outros produtos farmacêuticos e outras formas de interação:**

Em estudos farmacológicos, não foi detectada nenhuma interação entre o glicosídeo cardíaco ouabaína e o Pimobendan.

O aumento na contratilidade cardíaca induzido pelo Pimobendan é atenuado na presença do antagonista do cálcio verapamil e do β -antagonista propranolol.

Contraindicações e Precauções:**Precauções especiais para uso em animais:**

Recomenda-se que a utilização em “estágio pré-clínico” (assintomático com um aumento no diâmetro final do ventrículo esquerdo sistólico e diastólico), deve ser feito o diagnóstico através de um exame cardíaco global (incluindo exame ecocardiográfico e possivelmente monitoramento por Holter). Variações cardíacas específicas das raças (EX. diâmetro ventricular esquerdo (LDV) na sístole e na diástole) devem ser levadas em conta. Monitoramento da função e morfologia cardíaca é recomendado em animais tratados com Pimobendan. A glicose no sangue deve ser monitorada regularmente durante o tratamento com Pimobendan em cães com diabetes *mellitus*.

O uso do Pimobendan não foi avaliado em cães com idade inferior a 6 meses, cães com defeitos cardíacos congênitos, cães com diabetes *mellitus* ou outras doenças metabólicas graves.

Uso durante a prenhez, lactação ou parto:

Em estudos com ratos e coelhos, o Pimobendan não mostrou efeito na fertilidade. Efeitos embriotóxicos somente ocorreram em doses maternotóxicas. Em experimentos com ratos, foi demonstrado que o Pimobendan é excretado no leite. A segurança do produto não foi avaliada em cadelas prenhes ou lactantes. Usar somente de acordo com a avaliação risco/benefício pelo veterinário responsável.

Reações Adversas:

Efeitos adversos observados durante estudos clínicos com o Pimobendan incluíram: falta de apetite, diarreia e letargia. Entretanto, vale ressaltar que todos os efeitos observados durante os estudos podem estar relacionados à ICC, à terapia para ICC ou a ambas. Não exceder a dose recomendada.

Advertência:

Em caso de superdosagem, deve ser iniciado o tratamento sintomático. O produto não foi testado em casos de cardiomiopatia dilatada assintomática em Dobermans com fibrilação atrial ou taquicardia ventricular sustentada.

No caso de ingestão acidental, buscar auxílio médico imediatamente e mostrar a bula ou o rótulo do produto ao médico.

Lavar as mãos após o uso.

Aviso aos médicos: ingestão acidental, especialmente por uma criança, pode levar à ocorrência de taquicardia, hipotensão ortostática, rubor da face e dores de cabeça.

Apresentação:

Frascos contendo 50 comprimidos, embalados em cartuchos e acompanhados de bula.

Prazo de validade:

Prazo de validade do produto embalado para venda: 36 meses.

Lote, data de fabricação e data de validade: vide rótulo.

Venda sob prescrição e uso sob orientação do Médico Veterinário.

Armazenar o produto entre 15°C e 30°C. Armazenar na embalagem original bem fechada para proteger da umidade, em local seco e fresco, ao abrigo da luz solar.

Manter longe do alcance de crianças e animais domésticos.

Fabricante: Boehringer Ingelheim Promeco S.A. de C.V.

Calle Maiz 49, Bairro Xaltocan

Del. Xochimilco C. P. 16090, Mexico, D. F., Mexico

Representante exclusivo no Brasil, importador e distribuidor:

Boehringer Ingelheim Animal Health do Brasil Ltda.

Rod. Régis Bittencourt, Km 286 - Itapecerica da Serra - SP

CEP 06888-700

CNPJ: 57.600.249/0001-55

Responsável Técnica: Simone Brainer Zampieri - CRMV-SP 19.996

Licenciado provisoriamente no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, sob o nº 00008798/2015 em 06/02/2017.

Produto importado.

SAC: 0800 888 7387